

## 要 旨

### 試験委託者

環境庁

### 表 題

2, 4-ジクロロアニリンのオオミジンコ (*Daphnia magna*) に対する繁殖阻害試験

### 試験番号

5 B 4 9 3 G

### 試験方法

本試験は、OECD 化学品テストガイドライン No. 202 「ミジンコ類、急性遊泳阻害試験および繁殖試験」 (1984年) に準拠して実施した。

- 1) 被験物質： 2, 4-ジクロロアニリン
- 2) 暴露方式： 半止水式 (週に3回, 試験液の全量を交換)
- 3) 供試生物： オオミジンコ (*Daphnia magna*)
- 4) 暴露期間： 21日間
- 5) 試験濃度 (設定値)： 対照区, 助剤対照区, 0.0050, 0.016, 0.050, 0.16, 0.50 mg/L  
(公比 3.2, 助剤濃度一定: 2 mg/L, HCO-30および2-メキセタノールを使用)
- 6) 試験液量： 800 mL
- 7) 連数： 4 容器/濃度区
- 8) 供試生物数： 40頭/濃度区 (1 連につき10頭で1 濃度区40頭)
- 9) 試験温度： 20±1℃
- 10) 照明： 16時間明/8時間暗
- 11) 被験物質の分析： HPLC法

## 結 果

### 1) 試験液中の被験物質濃度

暴露期間中に測定した試験液の調製時および換水前の被験物質実測濃度が、全て設定値の±20%以内であったので、各影響濃度の算出には設定値を採用した。

### 2) 21 日間の親ミジンコの半数致死濃度 (LC50) :

0.084 mg/L (95%信頼限界 : 0.045~0.19 mg/L)

### 3) 21 日間の 50% 繁殖阻害濃度 (ErC50) :

0.044 mg/L (95%信頼限界 : 0.039~0.051 mg/L)

### 4) 21 日間の最大無作用濃度 (NOECr) : 0.016 mg/L

### 5) 21 日間の最小作用濃度 (LOECr) : 0.050 mg/L